BENZATHINE PENICILLIN

Benzathine benzylpénicilline 600 000 U.I ou 1.2 M.U.I

Poudre et solvant pour solution injectable

Composition :

- **BENZATHINE PENICILLIN 600 000 U.I :**

- Chaque flacon de poudre de **BENZATHINE PENICILLIN 600 000 U.I** contient :
Benzathine benzylpénicilline…….....600 000 U.I
- Chaque ampoule de solvant contient :
Eau pour préparations injectables…….…….....5 ml

- **BENZATHINE PENICILLIN 1.2 M.U.I :**

- Chaque flacon de poudre de **BENZATHINE PENICILLIN 1.2 M.U.I** contient :
Benzathine benzylpénicilline…….....1 200 000 U.I
- Chaque ampoule de solvant contient :
Eau pour préparations injectables…….....5 ml

Classe pharmaco thérapeutique :

ANTIBIOTIQUE DU GROUPE DES PENICILLINES.
(J : anti-infectieux).

Indications thérapeutiques :

La BENZATHINE PENICILLIN est indiquée dans le traitement des infections dues aux germes définis comme sensibles et notamment :

- Traitement de la syphilis et du pian.
- Prophylaxie des rechutes du rhumatisme articulaire aigu.

Posologie :

La dose et les fréquences d'administration sont variables en fonction de l'infection traitée, et doivent être adaptées à chaque patient.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN TRAITANT.

Voie d'administration :

- La préparation s'injecte par voie **<u>strictement intramusculaire</u>** profonde. Ne pas injecter par voie intraveineuse.

Mode d'emploi :

- Préparer aseptiquement la solution en introduisant dans le flacon au moins 2 ml d'eau pour préparation injectable pour une dose de 0.6MUI, et au moins 3 ml d'eau pour préparation injectable pour une dose de 1.2M.U.I.
- Agiter bien cette suspension pendant 20 secondes, et injectez-la extemporanément.
- En cas d'administration réitérée, alterner les sites d'injection.

Contre indications :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

- Allergie connue aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines) : tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques du groupe des céphalosporines.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

- Un interrogatoire préalable est nécessaire avant toute administration du médicament afin de rechercher les antécédents de réactions d'hypersensibilité provoquées suite à l'administration d'une pénicilline ou d'une céphalosporine. Devant des antécédents d'allergie, l'utilisation du médicament est formellement interdite.

- Surveiller le malade après l'administration pendant 30 minutes. Arrêter le traitement devant l'apparition d'une allergie et traiter le malade par les moyens usuels.
- Ne pas injecter ou instiller la BENZATHINE PENICILLIN par voie sous cutanée, intraveineuse, intralombaire ou intracavitaire.

Précautions d'emploi :

Il convient de prévenir votre médecin en cas d'allergie ou d'insuffisance rénale.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses :

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec le méthotrexate, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

- En cas de besoin, ce médicament peut être administré pendant la grossesse.
- Le passage de la Benzathine benzylpénicilline dans le lait maternel est faible, en conséquence l'allaitement est possible. Toutefois interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose ou d'éruption cutanée chez l'enfant.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Effets indésirables :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke, gène respiratoire, choc anaphylactique.
- Eruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée et candidose.
- Manifestations d'origine immunoallergiques et plus rarement: augmentation modérée et transitoire des transaminases sériques, anémie, leucopénie, thrombopénie réversible.
- Colite pseudomembraneuse.
- Encéphalopathie après administration de forte posologie en particulier chez l'insuffisant rénal.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Présentations :

- Une boite de **BENZATHINE PENICILLIN 600 000 UI** contient un flacon de Benzathine benzylpénicilline 600.000 UI en poudre et une ampoule d'eau pour préparation injectable**.**
  N°D.E :09 /13 G 060/ 097
- Une boite de **BENZATHINE PENICILLIN 1 200 000UI** contient un flacon de benzathine benzylpénicilline 1.200.000 UI en poudre et une ampoule d'eau pour préparation injectable**.**
  N° D.E : 08/13 G 061 / 121

Conservation :

Conserver à l'abri de la lumière à une température ne dépassant pas 25C°.

Ne jamais laisser le médicament à la portée des enfants

LISTE I

Date de mise à jour de la notice : Mars 2010

Fabriqué par : ASIA Pharmaceuticals Labs(S.A.R)

Importé par : Sarl SANAMED-45, Zone d'activité de Zeralda - ALGER